

Activiteitenverslag 2024 van Stichting Waterlandse Weiden

Eind december 2023 is circa 22 ha. vochtig weidevogelgrasland, rietland en veenmoeras, dat voorheen eigendom was van Staatsbosbeheer, aan het beheerareaal van De Waterlandse Weiden toegevoegd. Daarmee is de totale beheeroppervlakte van De Waterlandse Weiden op circa 75ha gekomen. Gezien het achterstallige onderhoud en het uitgevoerde beheer op deze uitbreiding, is er door de beheerder in 2024 behoorlijk wat tijd en energie gestoken om dit weer op niveau te krijgen.

Van alle percelen is de verruiging in de vorm van bomen, struiken en andere wildgroei, met name op rietlanden langs de Uitdammer Die en het Goudriaankanaal verwijderd. Hiermee zijn ideale schuilplekken voor predatoren van weidevogels verdwenen en moeten o.a. roofvogels, vossen en hermelijnen op zoek naar andere plekken. Ook zijn alle rietlanden gemaaid en is het riet gehakseld en over het land uitgereden. Er is kalk gestrooid ter voorkoming van pitrus en bokashi uitgereden om het land vruchtbaar te krijgen voor kruidenrijk grasland. Alle percelen zijn voorzien van greppels waarmee in het voorjaar vernatting (plas-dras) van de percelen mogelijk is. Alle bovenstaande maatregelen zijn genomen om ideale omstandigheden te creëren voor optimalisatie van de leefomgeving van de weidevogels en het behoud van de weidevogels in het gebied.

In opdracht van 'Stichting Waterlandse Weiden' is er ook in 2024 weer een weide vogeltelling geweest.

In 2024 zijn in De Waterlandse Weiden van 27 soorten broedvogels in het totaal 256 territoria vastgesteld. Daarvan komen er negen voor op de Rode Lijst; Slobeend, Wintertaling, Zomertaling, Grutto, Tureluur, Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart, Graspieper en Kneu. Sinds de vernatting in 2020 is het aantal soorten weidevogels dat gebonden is aan vochtige graslanden duidelijk toegenomen. Ondanks de aanwezigheid van een stroomraster rond een deel van het gebied was het broedsucces van Grutto en Tureluur te laag om de lokale populatie op langere termijn in stand te houden. Belangrijkste reden hiervoor is de aanwezigheid van predatoren tijdens het broedseizoen in het leefgebied. Met het verwijderen van de verruiging is een belangrijke stap gezet in de bestrijding van de predatoren, wat komende jaren een positief effect zal hebben op de populatie weidevogels.